
	Protocole Sanitaire	
Date : 25/11/2020	Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - V3	Auteur : Frédéric de la PALLIERE

Les gestes de premiers secours

Avant d'accéder à la victime, le SST doit, en effectuant une approche prudente de la zone d'intervention, se protéger.

Il devra porter un masque chirurgical et une paire de gants à usage unique. Dans la mesure du possible, il gardera ses distances avec la victime et les proches de celle-ci.

SECOURIR :

1. La victime se plaint de brûlures, d'une douleur empêchant certains mouvements ou d'une plaie qui ne saigne pas abondamment

- Chercher la coopération de la victime et l'inciter à pratiquer les gestes de secours sur elle-même. Si elle ne le peut pas, réaliser les gestes de secours.
- Surveiller la victime à distance dans l'attente d'un relais ou d'un conseil médical.


2. La victime ne répond pas

2.1 Après la phase de protection :

- Allonger la victime sur le dos,
- Ne pas procéder à la bascule de la tête de la victime pour libérer les voies aériennes, ne pas tenter de lui ouvrir la bouche,
- Ne pas se pencher au-dessus de la face de la victime, ne pas mettre son oreille et sa joue au-dessus de la bouche et du nez de la victime,
- Apprécier la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent.

2.2 La victime ne répond pas mais elle respire :

- Faire alerter (ou alerter) les secours,
- Sauf contre-ordre des secours alertés : laisser la victime allongée sur le dos, ne pas la mettre en position latérale de sécurité (PLS),
- Surveiller en permanence la respiration de la victime en regardant son ventre et sa poitrine.

	Protocole Sanitaire	
Date : 25/11/2020	Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - V3	Auteur :Frédéric de la PALLIERE

2.3 La victime ne répond pas et ne respire pas (arrêt cardio-respiratoire).

- Faire alerter (ou alerter) les secours et demander un défibrillateur (DAE),
- Débuter immédiatement les compressions thoraciques,
- Mettre en œuvre le DAE le plus vite possible (se tenir au pied de la victime lors de l'administration du choc) et suivre les instructions données par le service de secours alerté,
- Si possible, placer un tissu, une serviette ou un masque sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux compressions thoraciques et à la défibrillation. Cela réduit le risque de propagation du virus par voie aérienne pendant les compressions thoraciques,
- Ne pas faire de bouche à bouche. Toutefois, deux situations sont laissées à l'appréciation du sauveteur secouriste du travail :
 - le sauveteur secouriste du travail vit sous le même toit que la victime (risque de contamination par le virus Covid-19 déjà partagé),
 - la victime est un enfant ou un nourrisson.

Mesures complémentaires

Dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à bien se laver les mains après intervention (également après le retrait des gants) avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique.

Tout ce qui aura été en contact avec la victime devra être nettoyé (chaise, lit d'examen, poignées de porte...). Les gants et le masque de protection devront être retirés comme indiqué dans le référentiel sécurité.

Les déchets occasionnés par cette intervention doivent :

- Être placés en double sacs étanches, seuls ou avec des déchets banals,
- Les sacs doivent être correctement fermés et ligaturés avant,
- Ils doivent être stockés 24 heures avant d'être éliminés dans la filière des déchets industriels banals.

Information de la cellule info coronavirus

Tous les accidents du travail impliquant un collaborateur avec les signes du Covid-19 doivent être immédiatement remontés à cette cellule par l'intermédiaire du Permanent.